



リスク段階	項目 触診・視診・問診 (よく触って・よく診て・よく聴いて)	フットチェック間隔
High	リスク 8 足潰瘍・切断既往がある	1回 / 月
	リスク 7 知覚神経障害あり 血流障害あり (ABI=0.6 ~ 0.8 or SPP40 未満) セルフケアできない	1回 / 月
	リスク 6 知覚神経障害なし 血流障害あり (ABI=0.6 ~ 0.8 or SPP40 未満) セルフケアできない	1回 / 月 (観察時にケア予定の 計画立案)
	リスク 5 知覚神経障害あり 血流障害あり (ABI=0.6 ~ 0.8 or SPP40 未満) セルフケアできる	1回 / 2ヶ月
	リスク 4 知覚神経障害なし 血流障害あり (ABI=0.6 ~ 0.8 or SPP40 未満) セルフケアできる	1回 / 3ヶ月
	リスク 3 知覚神経障害あり 血流障害なし (ABI=0.9 ~ 1.3) セルフケアできない	1回 / 4ヶ月 (フットケア15ヶ月毎)
	リスク 2 知覚神経障害なし 血流障害なし (ABI=0.9 ~ 1.3) セルフケアできない	1回 / 6ヶ月 (フットケア3ヶ月毎)
	リスク 1 知覚神経障害あり 血流障害なし (ABI=0.9 ~ 1.3) セルフケアできる	1回 / 6ヶ月
Low	リスク 0 知覚神経障害なし 血流障害なし (ABI=0.9 ~ 1.3) セルフケアできる	1回 / 年

★ABI0.9 以下または 1.3 以上動脈触知不良でリスク 4 以上の場合は SPP 測定。

『SPP40 未満で下肢動脈血流エコー』

DM 性視力障害はセルフケアできないに分類。